老年人舒筋保健操

朱海玲

俗话说：“筋长一寸，寿长十年。”

拉伸动作能让韧带和肌肉得到放松，但正确的拉筋方法却不是人人知晓。到底，老年人应该怎样科学拉筋呢？

老人在拉筋前应先进行慢走热身，再由上往下拉伸身体各个关节的软组织。而且，拉筋的强度宜循序渐进，不要借助旁人的力量，以免用力过度，导致不必要的运动损伤。

第一式：头颈式
动作要领：双手叉腰，两脚分开，与肩同宽。吸气，同时将颈部往后拉伸，眼看天花板，保持20~30秒。然后呼气，同时将颈部向前屈曲，保持20~30秒。重复进行2~3次。

第二式：旋肩式
动作要领：两脚分开，与肩同宽。左手叉腰，右手握拳，并向右上方举高。先以顺时针转动右手手臂15~20次，再以逆时针转动右手手臂15~20次。两手轮换，重复进行2~3次。

第三式：反手式
动作要领：先将左手往上举，然后翻掌，使左手掌心朝外。接着以右手握住左手手腕，并往右侧拉伸，拉伸时要保持左手手臂伸直，保持30秒。两手轮换，重复进行2~3次。

第四式：背屈式
动作要领：两脚分开同肩宽，左手向前伸直，右手握住左手手掌，使之背屈，保持20~30秒。再换右手向前伸直，左手握住右手手掌，使之背屈，保持20~30秒。两手轮换，进行2~3次。

第五式：上屈式
动作要领：左手向前伸直，右手握住左手手掌，使之反掌向上屈曲，保持20~30秒。再换右手向前伸直，左手握住右手手掌，使之反掌向上屈曲，保持20~30秒。两手轮换，进行2~3次。

第六式：大腿式
动作要领：左手扶椅背，同时右手握住

右脚踝，使右腿往后屈曲，并尽量紧贴臀部，保持20~30秒。再换另一侧进行相同动作，同样保持20~30秒。两腿轮换，重复进行2~3次。

第七式：小腿式
动作要领：左脚在前，右脚在后，两脚呈弓步姿势摆放。然后将身体重心向前倾，同时保持两脚脚跟着地，使右侧小腿有拉伸感，保持20~30秒。两脚轮换，重复进行2~3次。

第八式：俯卧后伸
动作要领：俯卧在床上，两手自然伸直于体旁。先将左腿往后伸直、抬高至自身可承受的最高点，保持20~30秒，使同侧腰肌有拉伸感。两腿轮换，重复进行2~3次。

第九式：俯卧抬腿
动作要领：俯卧在床上，两手放置在腰上，用右手握住左手，以稳定腰部力量。然后两腿同时往上抬起至自身可承受的最高点，保持20~30秒，重复进行2~3次。

第十式：俯卧抬头
动作要领：俯卧在床上，两手十指交扣，并放置在颈后方。然后用力抬起上半身，至自身可承受的最高点，保持20~30秒，重复进行2~3次。

健康话题

夏季，慢阻肺康复黄金期

简文物

因病情相对好转，夏季对慢阻肺患者来说是最轻松的季节，于是不少患者便“见好就收”，自行停药。对此，专家提醒，慢阻肺是一种会导致患者呼吸功能逐渐下降的慢性疾病，自行停药极可能造成病情恶化，必须坚持治疗。

许多慢阻肺患者一感觉自己呼吸困难的症状有所缓解，就认为已经痊愈。实际上，慢阻肺的病程分为“稳定期”和“急性加重期”。在夏季，很多患者处于稳定期，此时虽咳嗽减轻，但尚未痊愈，得坚持治疗。稳定期坚持治疗主要目的在于预防慢阻肺急性加重，改善日常活动能力，尽可能恢复受损的心肺功能，防止或减缓心肺功能继续减退及各种并发症的发生。因此，夏季是慢阻肺患者康复治疗的黄金季节。此外，在夏季的稳定期坚持治疗，还能预防秋冬季慢阻肺急性加重，为之后秋冬季“阻击战”打好基础。专家介绍，稳定期慢阻肺的处理措施包括以下几点。

- 1.慢阻肺患者进入稳定期后，食欲不振的情况因咳、喘减轻而有所改善，所以这段时间可以加强营养。患者宜选低碳水化合物、高蛋白饮食，控制主食摄入量，注意补充鱼、肉、蛋、奶；但对于病重出现呼吸困难者，大鱼大肉会加重呼吸困难。
- 2.吸烟是慢阻肺患者明确的已知危险因素，因此戒烟是保护肺功能的第一步。
- 3.坚持药物治疗能够改善症状和预防复发，减少发作频率和严重程度，改善健康状况和提高活动耐受能力等。“肺功能检测是评估慢阻肺病情的金标准，要依据评估结果，选择稳定期的主要治疗药物。”专家说。
- 4.加强体育锻炼。选择适合自身条件的运动方式，锻炼强度和时间，循序渐进。开始时每次坚持5~10分钟，每日4~5次。逐渐适应后，可延长至每次20~30分钟，每日3~4次。如步行、慢跑、太极拳、广播体操等。
- 5.长期氧疗也是一种有效缓解慢阻肺症状的方法。它能纠正低氧血症，减少并发症，提高患者生活质量。但是并非所有慢阻肺患者都需要长期氧疗，所以患者最好先咨询专业医生后再决定。

医生的话

女性中风有独特表现

公永太

美国“女性健康”网近日报道称，中风已成为美国女性健康的第三大杀手，65岁以下女性的中风发生率高达34%。女性特有的激素水平变化在中风的发生发展中起到重要作用，尤其雌激素可显著影响动脉血管舒缩功能，导致血栓形成。服用避孕药或怀孕都可诱导激素水平紊乱，增加女性中风风险。近年的临床研究发现，中青年女性中风发作前具有独特表现，可帮助女性尽早发现脑血管疾病。

面部改变。照镜子时发现自己的脸明显僵硬、麻木，动作迟缓，或是眼睑变小，眼皮下垂，尤其是其中一侧面部出现上述表现时，要高度警惕中风的可能，应立即去医院进行诊治。

全身无力。最先出现无力表现的常是上肢，表现为动作笨拙、拿不住东西或不协调，累及一侧肢体的情况较多见，双侧同时出现的相对较少。

语言笨拙。有些人常感话到嘴边说不出，一时想不到适合的词汇，只重复没有意义的话语，这些都是中风早期的表现。若同时出现面部和肢体症状，应高度警惕已出现脑梗。

突发晕厥。有一部分女性在毫无征兆的情况下，突然晕倒，常持续几分钟至十几分钟，可自己苏醒过来。这说明脑血管已有堵塞，导致脑供血不足。

意识模糊。表现为有时突然忘记自己做过什么事情或在什么地方，或是记忆力减退。

头晕恶心。未经剧烈运动或没有感冒的情况下出现上述症状，提示存在中风的可能。

癫痫发作。中风常引起严重脑损伤，进而诱发癫痫表现。有些女性在未出现肢体偏瘫时，先发生癫痫也提示患有中风。

剧烈头痛。女性常易患偏头痛，慢性偏头痛可使患者中风概率增加50%。因此，一旦出现剧烈头痛，要迅速就医。

不停打嗝。出现持续半分钟以上的打嗝，就要考虑是否存在中风。

女性关怀

黄芪，补药之长

宁艳梅

黄芪作为药用已有2000多年历史。《神农本草经》将黄芪列为上品，原名黄耆(读音qí)，‘耆’指德高望重的老人，李时珍在《本草纲目》中称：“耆，长也。黄耆色黄，为补药之长，故名”。《本草汇言》称其：“补肺健脾，实卫敛汗，驱风运毒之药也”，主治气虚之短气乏力、食少、大便不成形、中气下陷、水肿等症。

黄芪药性甘，微温，是常用的补气药，主入脾经，可治疗脾气亏虚引起的胃部胀满、精神不振、形体消瘦等，可与大枣熬膏，去渣以蜂蜜调味服用。因其温热，所以善升举脾胃清阳之气，治疗脾气虚，中气下陷之久泻脱肛、内脏下垂，为补中益气丸和升阳举陷的要药。此外，黄芪可治疗因气血不足引起的面色萎黄、神衰疲惫等症，常与当归配伍，称当归补血汤，水煎内服用于产后或病后补益气血。除了补气，黄芪还有多种功效。

利尿消肿。黄芪因善补脾气，所以也可用于脾气虚、水湿运化失常、四肢浮肿、小便不利。黄芪可与茯苓、白术、防

己等健脾利水之品配伍，如《金匮要略》的防己黄芪汤。

补益肺气。《本草求真》记载：“黄耆，入肺补气，入表实卫，为补气诸药之最”，治疗肺气亏虚，短气虚喘，常与人参、蛤蚧、紫菀、款冬花等补益肺肾、止咳定喘之品同用。

益卫固表。脾主肌肉，肺主皮毛，因此黄芪具有益卫固表之效，治疗气虚卫表不固，自汗恶风。《灵枢》中指出：“黄耆既补三焦，实卫气……脾胃一虚，肺气先绝，必用黄耆温分肉，益皮毛，实腠理，不令汗出，以益元气而补三焦。”常与防风、白术等同用，如玉屏风散。

补虚通滞。黄芪在治疗痹症日久、肌肉麻木或中风半身不遂等属气虚血滞方面效果较好，可与羌活、当归、川芎等祛风活血之品配伍。

黄芪蜜炙补气升阳，容易助火、敛邪，凡表实邪盛、气滞湿阻、热毒疮疡皆不宜用。《本草备要》记载：“生用固表，无汗能发，有汗能止，温分肉，实腠理，泻阴火，解肌热；炙用补中，益元气，温三焦，壮脾胃。生血，生肌，排脓内托，疮痍圣药。痘症不起，阳虚无热者宜之。”

健康常识

导航用多了，大脑衰退早

萧忠彦

你还记得上一次使用纸质地图，绞尽脑汁找方位是在什么时候吗？在陌生的街道、荒芜的高速路，有了先进的导航系统就不会迷路了。但英国《自然·通讯》杂志刊登的一项最新研究称，卫星导航会让人的大脑衰退。

英国伦敦大学的科学家们让24名志愿者在计算机模拟的伦敦街道中穿行，并使用功能性磁共振成像仪监测他们的大脑活动。结果表明，当参试者遇到伦敦的地标建筑时，大脑海马体和前额叶皮质的活性明显增强；但是当卫星导航向他们提供指示时，大脑的这些部位完全不会活跃起来。

该研究首席作者雨果·斯皮尔斯认为，人们在迷路时会对自身大脑海马体和前额叶皮质提出求救信号。海马体会为我们模拟出可行的路径，前额叶皮质会帮助我们规划和决策到达目的地的方式。卫星导航的出现“切断”了海马体与前额叶皮质之间的联系，大脑对路径网络“提不起兴趣”，不会做出任何空间推理反应。对此，研究人员有这样的担心：久而久之，人类的大脑海马体与前额叶皮质有可能萎缩成毫无用处的“葡萄干”，到时我们将无法再进行与记忆有关的工作。

医学发现