

就美方武力袭击中国民用无人飞艇

国防部新闻发言人发表谈话

新华社北京2月5日电 国防部新闻发言人谭克非2月5日就美方武力袭击中国民用无人飞艇发

表谈话表示,美方动用武力袭击我民用无人飞艇,这是明显过度反应。我们对美方这一做法表示严

正抗议,保留使用必要手段处置类似情况的权利。

多地开展新冠病毒抗体检测服务引关注

近日,新冠病毒抗体检测引发各界关注与重视,多地疾控中心发文提及开展新冠病毒抗体检测。

多地开展新冠病毒抗体检测服务

1月15日,武汉疾控预防医学服务中心推出新冠病毒核酸抗体水平检测服务。1月31日,北京疾控中心副主任王全意对媒体透露,北京市即将开展人群血清抗体调查,采取多阶段分层随机抽样调查方法,从16个辖区和经开区中选取约5000名社区人群,进行问卷调查和血清学标本采集。

2月3日,湖南疾控发布通知,自2月7日起,湖南省疾病预防控制中心开展新型冠状病毒2019-nCoV抗体检测服务,有助于科学评估新冠康复免疫状况及二次感染的抵抗力,可以作为新冠病毒感染辅助诊断的依据,也可用于新冠病毒疫苗接种时间及接种方案的推荐依据。

通知中提到,新型冠状病毒2019-nCoV抗体检测费用为32元,有需求的市民可到湖南省疾病预防控制中心门诊部二楼导诊台现场预约,即时抽血进行抗体检测,每日限号100人。采样后的第二个工作日下午4时可以在门诊部二楼导诊台领取纸质报告。

什么是新型冠状病毒2019-nCoV抗体?

新冠病毒抗体,是感染新冠病毒后机体自我产生的免疫反应标志性物质,常见的有IgM抗体和IgG抗体。

在感染新冠病毒后5天左右,血清中会逐渐产生IgM抗体,但该抗体衰减较快,只能维持2周~3周时间。检出IgM提示最近发生感染,可用于感染的早期诊断。

IgG抗体一般出现在IgM抗体之后,可在血液中维持较长时间,当机体再次感染相同病毒时,对人体起到一定的免疫保护作用。IgG抗体在感染中晚期出现,滴度有一个持续增高的过程,并在血液循环中保持较长时间



存在。

山西省临汾市第三人民医院检验科主任吕晓介绍:“IgG大概在病毒感染后的10天~15天才出现,3周~4周达到一个高峰,之后缓慢下降,大部分人可持续半年或者一年以上,对人体再次感染有保护作用。”

检测新冠病毒抗体数值,可以帮助受检者评估自身对新冠病毒的免疫力情况,是科学做好个人防护的参考依据。特别是对于高危人群而言,比如至今尚未感染新冠病毒或者患有高血压、糖尿病、心脑血管疾病、慢性肝肾疾病、恶性肿瘤等疾病老年人群体。

如何看懂检查结果?

若新冠病毒IgM抗体检测为阳性且有相关临床症状,可作为新冠病毒感染的辅助性诊断依据,此时暂不推荐接种新冠病毒疫苗。

若新冠病毒IgG抗体阳性,IgM抗体阴性,则提示受检者既往感染过新冠病毒并基本恢复,或提示曾经接种过新冠疫苗。

若新冠病毒IgM和IgG抗体均为阳性,提示受检者可能处于新冠病毒感染期,需要进一步排查。需要注意

的是,如果受检者在两周前后接种过新冠病毒疫苗,也有可能导致IgG和IgM抗体阳性。

高血压、糖尿病、心脏病、尿毒症肾衰等老年患者要警惕

对于患有高血压、糖尿病、心脏病、尿毒症肾衰等疾病的老年人,海南医学院公共卫生学院院长宁毅建议:“有条件的情况下,可以为家中老人,特别是80岁以上的高龄老人检测新冠病毒抗体数值。”

老年人一旦感染新冠病毒,很容易引起基础疾病加重,进而引发一系列的并发症,导致呼吸困难、动脉血氧饱和度低等症状,十分危险。

检测家中老人体内的新冠病毒抗体数值,可以帮助子女判断老人是否曾经感染过新冠病毒及目前感染阶段、对新冠病毒有无免疫力以及免疫力的强弱等。

这些可以为老人的科学防护提供参考,假如检测出来老人的新冠病毒抗体数值较低,子女等家属应加强科学防护意识,比如提醒老人均衡饮食营养、保证充足休息、尽量少去或不去人群聚集的场合、再次接种疫苗等。

本报综合消息

应急管理部派工作组赶赴许广高速湖南长沙段交通事故现场指导处置

新华社北京2月5日电 记者5日从应急管理部获悉,应急管理部派工作组赶赴许广高速湖南长沙段交通事故现场指导处置。

2月4日17时许,湖南省长沙市望城区境内许广高速发生多车相撞事故,造成重大人员伤亡。

接报后,应急管理部持续调度指导事故救援处置,要求科学救援、全力救治伤员,尽最大可能减少因伤亡和因伤致残;要尽快核实情况,实事求是开展事故调查;要认真吸取事故教训,排查风险隐患,举一反三,严防类似事故再次发生。应

急管理部已派出总工程师带队的工作组赶赴现场指导处置,派出国家应急医学研究中心医疗小组指导协助伤员救治。

事故发生后,当地消防救援队伍立即调派182人、30车赶赴现场,全力开展抢险救援工作。

国家医保局:逐步将辅助生殖技术纳入医保支付范围

针对关于建议将不孕不育治疗纳入免费医疗的提案,国家医保局近日答复,将逐步把适宜的分娩镇痛和辅助生殖技术项目纳入医保基金支付范围,并鼓励中医医院开设优生优育门诊,提供不孕不育诊疗服务。

国家医保局表示,医保部门始终高度重视人口问题,目前已将符合条件的生育支持药物,如溴隐亭、曲普瑞林、氯米芬等促排卵药品纳入医保支付范围,提升了部分患者的用药保障水平。该局提出将逐步把适宜的分娩镇痛和辅助生殖技术项目纳入基金支付范围,努力减轻不孕不育患者医疗负担,提高医疗保障水平。

2018年,国家卫健委组织开展了

中医药治疗不孕不育研究相关项目,对照研究了部分中医药在治疗女性子宫内薄性不孕不育症、男性少弱精症等方面的疗效作用。国家卫健委、国家中医药局要求进一步加强妇幼领域中医药工作,为有生育需求的夫妇提供优质的中医药服务,并梳理总结中医药治疗不孕不育的临床经验,形成不孕病中医诊疗方案和临床路径在全国推广使用。

目前,国家中医药局正在编制健康中国行动中中医药健康促进专项行动实施方案,鼓励中医医院开设优生优育门诊,提供不孕不育诊疗服务。国家卫健委等相关部门也将组织开展中医药适宜技术和中成药用药培训、中

医药健康教育,制定推广有关不孕不育治疗的中西医结合诊疗方案,推动中医医院开展不孕不育诊疗服务。

在加强妇幼中医药人才队伍建设方面,国家卫健委提出加强骨干人才培养培训,鼓励西医妇产科临床医师学习中医,鼓励中医医疗机构具有高级职称的中医妇科医师多点执业。国家中医药局将深入推进中医药特色人才培养工程(岐黄工程),在相关人才培养专项中,统筹加强不孕不育相关专业人才培养,到2025年,在每省(区、市)妇幼保健机构建立不少于2个传承工作室,每个工作室培养不少于10名中医药业务骨干。

本报综合消息

开学要做核酸吗 多地公布方案

随着元宵节过去,“超长寒假”即将结束。新学期开学还要做核酸吗?多地近期均公布了相应方案,细节上各有不同。

“福州日报”微信公众号消息,2月4日上午,福州市委教育工委、市教育局召开福州市教育系统新学期工作部署会议。会议强调,准确认识疫情防控新形势和健康安全第一的要求,牢牢守住校园安全底线。

一是防范意识风险意识不能有丝毫放松。我国防控工作重心从“防感染”转向“保健康、防重症”,实施“乙类乙管”,但学校、师生,依然是防控的重点场所、重点人群,各地各校要不折不扣按照上级相关精神和防控指南,保持清醒,持续做好校园疫情防控和卫生健康工作。

二是优化落实好疫情防控举措。要认真做好开学返校准备。返校前组织师生做好自我健康监测,出现发热、干咳、乏力、咽痛等症状应进行抗原或核酸检测,结果异常的,须如实报告学校,并延迟返校。开学前各校要开展一次全面彻底的校园卫生整治消杀,并合理储备防疫物资和药品。要调整优化检测策略。学校不再开展全员核酸筛查,师生员工出入校门和校园公共区域无须提供核酸证明。非疫情流行时,校外人员进校不再查验核酸证明;疫情流行时,要协同属地卫健部门按规范妥善处置。

三是时刻绷紧校园安全弦。各地各校要进一步压紧压实安全责任,聚焦校园安全薄弱环节和风险点,强化安全隐患排查整治;联合公安等部门开展护校安园专项行动,落实门卫值守、巡查制度,提升校园安全防护条件;落实常态化扫黑除恶工作,开展防欺凌专项整治,严肃校规校纪;落实安全教育培训制度,定期开展应急疏散演练,提高师生应急避险能力;常态化排查校舍及附属设施安全隐患,对排查发现的问题,特别是校园安全防护设施发现的问题要立即整改。

另据浙江媒体报道,2月6日,杭州中小学即将迎来新学期。这两天,杭州不少中小学、幼儿园发布开学告知书,请家长和学生提前做好开学准备。不少学校的开学返校告知书中,都提到了开学前一周的健康监测。开学返校前一周,学生居家每日开展测量体温和新冠感染相关临床症状观察等健康自测。出现发热、干咳、乏力、咽痛等症状,应进行抗原或核酸检测,如填写《健康异常情况填报表》。如检测结果为阳性,延迟返校。

也有学校提到,开学前一天做一次抗原或核酸检测;如出现发热、干咳、乏力、咽痛等症状,应及时进行抗原或核酸检测,如填写《健康异常情况填报表》并报告学校,如检测结果为阳性,延迟返校。

要求提供核酸阴性证明的还有浙江绍兴。1月30日,越牛新闻从绍兴市嵊州市教体局获悉,寒假结束时间为2月5日,如无特殊情况中小学(幼儿园)学生2月6日开学上课,2023年暑假放假时间初定为7月3日。

这两天,绍兴已经有不少中小学、幼儿园发布通知,请家长提前填写好“学生健康打卡”包括提供核酸阴性证明,做好开学准备。

宁波媒体报道,2月8日,宁波中小学即将迎来新学期。宁波市海曙外国语学校、宁波市第十五中学已经开始摸排健康情况确保安全开学。宁波市海曙外国语学校开始摸排老师们的健康和返甬情况,并由班主任老师了解班上学生的情况,确保安全开学。

据金华日报消息,这两天,金华市区部分学校已发布开学提醒,请家长和学生提前做好开学准备,并按要求填写《2023年春季开学健康监测表》,提醒如出现发热、干咳、乏力、咽痛等症状要及时检测抗原或核酸,如检测结果确认感染病毒,须如实报告学校,并延缓返校,不得带病到校学习。

此前,金华市教育局曾在1月18日发布消息,要求做好师生员工开学前7天每日居家健康监测。师生返校后连续7天开展健康监测,减少人员聚集。中小学(幼儿园)根据疫情形势和学校实际,开展师生筛检、轮检、抽检等核酸检测,但不作为师生出入校门的凭证。

近日,国家卫健委官网发布消息,国务院联防联控机制综合组印发《新型冠状病毒感染疫情防控操作指南》,其中的《学校新型冠状病毒感染疫情防控操作指南》,对校园疫情防控提出了具体要求。

《指南》要求,没有疫情的学校,开展正常的线下教学活动。疫情流行高峰期间,中小学校、幼儿园采取严格的封闭管理,高校可实施分区管理。师生出现发热、干咳、乏力、咽痛等症状时,不带病到校工作或学习。如检测结果确认感染病毒,须如实报告学校,延迟返校。师生入校时测量体温。学校在校舍入口、楼梯入口、电梯入口等位置摆放共用消毒用品,食堂餐桌安装隔板,学生错峰就餐。适当减小班额,加大桌椅间距。细化校内感染者分级诊疗办法,各级各类学校储备新型冠状病毒感染对症治疗药物、抗原检测试剂,以及常用防疫物资。不组织康复期的师生参加剧烈运动。

《指南》明确,高等学校不再开展全员核酸筛查。除跨地区返校入学确有必要外,高校师生出入校门和校园公共区域不要求提供核酸证明。高校校医院设立发热门诊,实行24小时值班值守制度。中小学校和幼儿园师生出入校门不再提供核酸证明,当感染者占比较大时,可以班级或年级为单位停止线下上课,实施线上教学。同时,落实晨午检制度、传染病疫情报告制度、因病缺勤缺课追踪登记制度等。

本报综合消息